

Masern - Info

Die Übertragung von Masern erfolgt durch direkten Kontakt über Tröpfchen, d.h. Speichel.

Die Kinder sind 3-4 Tage vor Ausbruch des Ausschlags und bis 5 Tage danach ansteckend.

Die Inkubationszeit (Zeit zwischen Kontakt mit Masern und Auftreten der Symptome) beträgt 8 bis 12 Tage.

Überstehen der Krankheit hinterlässt lebenslangen Schutz vor Masern.

Die Masern beginnen mit hohem Fieber und Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, Heiserkeit und bellendem Husten. Die Kinder sind lichtscheu (Konjunktivitis). Gleichzeitig oder 1 bis 2 Tage später treten weisse, kalkspritzerartige Flecken an der Wangenschleimhaut (innen im Mund) auf. Zudem dunkelroter Ausschlag am harten Gaumen.

Nach leichtem Fieberabfall folgt 3 bis 4 Tage später der typische Masernausschlag mit hohem Fieber und starkem Krankheitsgefühl. Der Ausschlag beginnt hinter den Ohren und im Gesicht und wandert zentrifugal über den ganzen Körper bis zu den Füßen. Zudem typische Lymphknotenschwellung.

Bei unkompliziertem Verlauf folgt nach dem 3. Tag des Ausschlags rascher Fieberabfall und Genesung. Der Ausschlag blasst ab.

Komplikationen sind:

- Bakterielle Mittelohrentzündungen
- Lungenentzündungen
- Masern - Krupp
- Masern - Hirnhautentzündung (1:500 - 1:2000) - am 3. bis 9. Tag nach Ausbruch des Ausschlags.